

3章 偏微分


1節 2変数関数と偏微分 (p.86~110)

練習1


- (1) $f(-2, 1) = -6 + 1 + 1 = -4$, $f(a, b-1) = 3a + b - 1 + 1 = 3a + b$
 (2) $f(-2, 1) = 4 + 3 = 7$, $f(a, b-1) = a^2 + 3(b-1) = a^2 + 3b - 3$

練習2


- (1) xy 平面の点 (x, y) 全体



- (2) $x + y \neq 0$ をみたす点 (x, y) 全体。つまり xy 平面から直線 $x + y = 0$ を除いた点 (x, y) 全体。



- (3) $y - 2x^2 > 0$ をみたす点 (x, y) 全体。つまり $y > 2x^2$ を満たす点 (x, y) 全体。



練習3

- (1) 平面 $2x + 3y - z = 0$ 。「 $(0, 0, 0)$ を通りベクトル $\vec{n} = (2, 3, -1)$ に垂直な平面」
 (2) x, y がどんな値であっても $z = 4$ なので、点 $(x, y, 4)$ (ただし x, y は任意) 全体の集まりだから「 $(0, 0, 4)$ を通り z 軸に垂直な平面」

練習4

$$(1) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x - y}{x + y} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r \cos \theta - r \sin \theta}{r \cos \theta + r \sin \theta} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta} = \frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \text{ のとき } \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1, \quad \theta = 0 \text{ のとき } \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$$

θ によって $f(x, y)$ は異なる値に近づくので極限值なし。

$$(2) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \cos^2 \theta r^2 \sin^2 \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{r^2} \quad (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \text{ より})$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} r^2 \cos^2 \theta \sin^2 \theta = 0 \quad (0 \leq \cos^2 \theta \leq 1, \quad 0 \leq \sin^2 \theta \leq 1 \text{ より})$$

練習 5

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) &= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} \\
 &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)}{r^2} \quad (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \text{ より}) \\
 &= \lim_{r \rightarrow 0} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta
 \end{aligned}$$

$\theta = 0$ のとき $1 - 0 = 1$, $\theta = \frac{\pi}{2}$ のとき $0 - 1 = -1$, θ により異なる値に近づくので極限值なし。

よって, $f(x, y)$ は $(0, 0)$ で連続でない。

$$(2) \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0 \quad (\text{練習 4 (2) より})$$

一方, 仮定より $f(0, 0) = 0$ 。よって, $f(x, y)$ は $(0, 0)$ で連続である。

練習 6

$$(1) \quad f_x = 2xy, \quad f_y = x^2, \quad f_x(2, 1) = 2 \times 2 \times 1 = 4, \quad f_y(2, 1) = 2^2 = 4$$

$$(2) \quad f_x = 2x + 2y, \quad f_y = 2x, \quad f_x(2, 1) = 2 \times 2 + 2 \times 1 = 6, \quad f_y(2, 1) = 4$$

$$(3) \quad f_x = \frac{(x-3y)_x(2x+y) - (x-3y)(2x+y)_x}{(2x+y)^2} = \frac{(2x+y) - (x-3y) \times 2}{(2x+y)^2} = \frac{7y}{(2x+y)^2}$$

$$f_y = \frac{(x-3y)_y(2x+y) - (x-3y)(2x+y)_y}{(2x+y)^2} = \frac{-3(2x+y) - (x-3y)}{(2x+y)^2} = \frac{-7x}{(2x+y)^2}$$

$$f_x(2, 1) = \frac{7}{(4+1)^2} = \frac{7}{25}, \quad f_y(2, 1) = \frac{-14}{(4+1)^2} = \frac{-14}{25}$$

$$(4) \quad f_x = 3(2x-3y)^2 \times (2x-3y)_x = 6(2x-3y)^2, \quad f_y = 3(2x-3y)^2 \times (2x-3y)_y = -9(2x-3y)^2$$

$$f_x(2, 1) = 6(4-3) = 6, \quad f_y(2, 1) = -9(4-3)^2 = -9$$

練習 7 (練習 6 で f_x, f_y はすでに求めている。)

$$(1) \quad f_{xx} = 2y, \quad f_{xy} = 2x, \quad f_{yx} = 2x, \quad f_{yy} = 0$$

$$(2) \quad f_{xx} = 2, \quad f_{xy} = 2, \quad f_{yx} = 2, \quad f_{yy} = 0$$

$$(3) \quad f_{xx} = 7 \cdot \frac{0 - y \cdot 2(2x+y) \cdot 2}{(2x+y)^4} = \frac{-28y}{(2x+y)^3},$$

$$f_{xy} = 7 \cdot \frac{1 \cdot (2x+y)^2 - y \cdot 2(2x+y) \cdot 1}{(2x+y)^4} = 7 \cdot \frac{2x-y}{(2x+y)^3},$$

$$f_{yx} = -7 \cdot \frac{1 \cdot (2x+y)^2 - x \cdot 2(2x+y) \cdot 2}{(2x+y)^4} = -7 \cdot \frac{2x+y-4x}{(2x+y)^3} = -7 \cdot \frac{-2x+y}{(2x+y)^3},$$

$$f_{yy} = -7 \cdot \frac{0 - x \cdot 2(2x+y) \cdot 1}{(2x+y)^4} = -7 \cdot \frac{-2x}{(2x+y)^3} = \frac{14x}{(2x+y)^3}$$

$$(4) \quad f_{xx} = 12(2x-3y) \cdot 2 = 24(2x-3y), \quad f_{xy} = 12(2x-3y) \cdot (-3) = -36(2x-3y),$$

$$f_{yx} = -18(2x-3y) \cdot 2 = -36(2x-3y), \quad f_{yy} = -18(2x-3y) \cdot (-3) = 54(2x-3y)$$

練習 8

練習 7 (4)より $f_{yx} = 108$, $f_{yx} = f_{xy} = -36(2x - 3y)$ より $f_{xy} = f_{yy} = 108$

練習 9

$$\begin{aligned} (1) \quad \frac{dz}{dt} &= f_x x'(t) + f_y y'(t) = 4x(-\sin t) + 6y \cos t \\ &= -4 \cos t \sin t + 6 \sin t \cos t \\ &= 2 \cos t \sin t = \sin 2t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{\partial z}{\partial u} &= f_x x_u + f_y y_u = 4x \cdot 1 + 6y \cdot v = 4(u + v) + 6uv \cdot v \\ &= 4u + 4v + 6uv^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial v} &= f_x x_v + f_y y_v = 4x \cdot 1 + 6y \cdot u = 4(u + v) + 6uv \cdot u \\ &= 4u + 4v + 6u^2v \end{aligned}$$

練習 10 $f_x = y$, $f_y = x$ であるので

$$(1) \quad (1+h)(1+k) = 1 \times 1 + (1+\theta k)h + (1+\theta h)k \quad \text{より}$$

$$1+h+k+hk = 1+h+\theta kh+k+\theta hk \quad \text{よって} \quad \theta = \frac{1}{2}$$

$$(2) \quad (1+h)(2+k) = 1 \times 2 + (2+\theta k)h + (1+\theta h)k \quad \text{より}$$

$$2+2h+k+hk = 2+2h+\theta kh+k+\theta hk \quad \text{よって} \quad \theta = \frac{1}{2}$$

練習 11

縦が x cm, 横が y cm, 高さが x cm とすると体積は $f(x, y) = x^2 y$ なので

$$\begin{aligned} f(6+0.1, 8+0.1) &\doteq f(6, 8) + 0.1 \times f_x(6, 8) + 0.1 \times f_y(6, 8) \\ &= 288 + 0.1 \times 96 + 0.1 \times 36 = 301.2 (\text{cm}^3) \end{aligned}$$

練習 12

$$(1) \quad f_x = 2x, \quad f_y = 2y \quad \text{より} \quad dz = 2x dx + 2y dy$$

$$(2) \quad f_x = y, \quad f_x = x \quad \text{より} \quad dz = y dx + x dy$$

練習 13

(1) 縦が x cm, 横が y cm とすると面積 z は $z = f(x, y) = xy$ なので

$$dz = f_x \Delta x + f_y \Delta y = y \Delta x + x \Delta y = 8 \times 0.1 + 6 \times 0.1 = 1.4 (\text{cm}^2)$$

(2) (1)に加え, 高さも x cm とすると, 体積 z は $z = f(x, y) = x^2 y$ なので

$$\begin{aligned} dz &= f_x \Delta x + f_y \Delta y = 2xy \Delta x + x^2 \Delta y \\ &= 2 \times 6 \times 8 \times 0.1 + 6^2 \times 0.1 = 6 \times 0.1 \times (2 \times 8 + 6) = 13.2 (\text{cm}^3) \end{aligned}$$

練習 14

$f_x = y, f_y = x$ である。

(1) $f_x(1, 1) = 1, f_y(1, 1) = 1$ より $z - 1 = 1(x - 1) + (y - 1)$

よって $x + y - z - 1 = 0$

(2) $f_x(1, 2) = 2, f_y(1, 2) = 1$ より $z - 2 = 2(x - 1) + 1(y - 2)$

$z - 2 = 2x - 2 + y - 2$ よって $2x + y - z - 2 = 0$

(3) 接点の z 座標は

$z = f(2, -1) = -2$ なので

接点は $(2, -1, -2)$ ⑦

一方, $f_x(2, -1) = -1$

$f_y(2, -1) = 2$ ⑧

⑦, ⑧より求める平面は

$z - (-2) = (-1)(x - 2) + 2(y - (-1))$

$= -x + 2y + 4$

よって, $z = -x + 2y + 2$

(4) 接点の z 座標は

$z = f(-1, -2) = 2$ なので

接点は $(-1, -2, 2)$ ⑦

一方, $f_x(-1, -2) = -2$

$f_y(-1, -2) = -1$ ⑧

⑦, ⑧より求める平面は

$z - 2 = -2(x - (-1)) + (-1)(y - (-2))$

$= -2x - y - 4$

よって, $z = -2x - y - 2$

節末問題 (p.106)

1

$$(1) \quad y = x^2 \text{ に沿って } (x, y) \rightarrow (0, 0) \text{ とすると } \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \frac{x^4}{x^4 + x^4} \longrightarrow \frac{1}{2}$$

$$y = 2x^2 \text{ に沿って } (x, y) \rightarrow (0, 0) \text{ とすると } \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \frac{x^2 \cdot 2x^2}{x^4 + 4x^4} \longrightarrow \frac{2}{5}$$

となるので極限值なし。

$$(2) \quad \text{与式} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (x^2 - y^2) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta) \\ = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} r^2 \cos 2\theta = 0 \quad (-1 \leq \cos 2\theta \leq 1 \text{ より})$$

2

$$f(0, 0) = 0 \quad \cdots \textcircled{7}$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \cos^2 \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = \lim_{r \rightarrow 0} \cos^2 \theta = \cos^2 \theta \quad \cdots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7} \neq \textcircled{8}$ なるので $f(x, y)$ は $(x, y) = (0, 0)$ で連続でない。よって、全微分可能でない。

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1-0}{h} \quad \text{よって, } x \text{ について偏微分可能でない。}$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0-0}{k} = 0 \quad \text{よって, } y \text{ について偏微分可能。}$$

$$(1) \quad z_x = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \times (yx^{-1})_x = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \times (-yx^{-2}) = \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

$$z_{xx} = -y \cdot \frac{-2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad z_{xy} = -\frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$z_y = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \times (x^{-1})_y = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad z_{yx} = \frac{(x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$z_{yy} = x \frac{-2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$(2) \quad z_y = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{y}\right)^2}} \times \left(\frac{x}{y}\right)_y = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{y}\right)^2}} \times (x)(-y^{-2}) = \frac{-x}{y\sqrt{y^2 - x^2}},$$

$$z_x = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{y}\right)^2}} \times \left(\frac{x}{y}\right)_x = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{y}\right)^2}} \times \frac{1}{y} = \frac{1}{y\sqrt{y^2 - x^2}},$$

$$z_{xx} = \left[(y^2 - x^2)^{-\frac{1}{2}} \right]_x = -\frac{1}{2} (y^2 - x^2)^{-\frac{3}{2}} \times (-2x) = \frac{x}{(y^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$z_{xy} = \left[(y^2 - x^2)^{-\frac{1}{2}} \right]_y = -\frac{1}{2} (y^2 - x^2)^{-\frac{3}{2}} \times 2y = \frac{-y}{(y^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$z_{yx} = -\frac{y\sqrt{y^2 - x^2} - x \left(y \cdot \frac{1}{2} (y^2 - x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2x) \right)}{y^2(y^2 - x^2)} = -\frac{y(y^2 - x^2) + x^2 y}{y^2 \sqrt{y^2 - x^2}^3} = \frac{-y}{(y^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$z_{yy} = -x \cdot \frac{-\left(\sqrt{y^2 - x^2} + y \cdot \frac{1}{2} (y^2 - x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (2y) \right)}{y^2(y^2 - x^2)} = x \cdot \frac{\sqrt{y^2 - x^2} + \frac{y^2}{\sqrt{y^2 - x^2}}}{y^2(y^2 - x^2)} = \frac{x(2y^2 - x^2)}{y^2(y^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$(3) \quad z_x = \frac{2x}{x^2 + y^2},$$

$$z_{xx} = 2 \cdot \frac{1(x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = 2 \frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$z_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}, \quad z_{yy} = \frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$z_{xy} = 2x \cdot \frac{-2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-4xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad z_{yx} = 2y \frac{-2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-4xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

4

$$z_r = z_x x_r + z_y y_r = z_x \cos \theta + z_y \sin \theta \quad \text{より}$$

$$(z_r)^2 = z_x^2 \cos^2 \theta + z_y^2 \sin^2 \theta + 2z_x z_y \cos \theta \sin \theta \quad \text{㊦}$$

$$z_\theta = z_x x_\theta + z_y y_\theta = z_x r(-\sin \theta) + z_y r \cos \theta \quad \text{より}$$

$$(z_\theta)^2 = z_x^2 r^2 \sin^2 \theta + z_y^2 r^2 \cos^2 \theta - 2z_x z_y r^2 \sin \theta \cos \theta \quad \text{㊧}$$

$$\text{㊦, ㊧より} \quad (z_r)^2 + \frac{1}{r^2} (z_\theta)^2 = z_x^2 + z_y^2$$

5

$$z = xy \quad \text{とすると} \quad \Delta z \doteq z_x \Delta x + z_y \Delta y = y \Delta x + x \Delta y$$

$$\text{ここで} \quad \Delta x = 0.1, \quad \Delta y = 0.1 \quad \text{とおくと} \quad \Delta z \doteq 8 \times 0.1 + 6 \times 0.1 = 1.4(\text{cm})$$

6

$$(1) \quad z = f(x, y) = x^3 y + 4xy^2 \quad \text{とおくと} \quad f_x = 3x^2 y + 4y^2, \quad f_y = x^3 + 8xy \quad \text{より}$$

$$f_x(1, -1) = 1, \quad f_y(1, -1) = -7 \quad \text{であり, 接平面は}$$

$$z - 3 = 1 \cdot (x - 1) - 7(y + 1) \quad \text{よって} \quad x - 7y - z - 5 = 0$$

$$(2) \quad z = f(x, y) = xy + 3xy^2 \quad \text{とおくと} \quad f_x = y + 3y^2, \quad f_y = x + 6xy \quad \text{より}$$

$$f_x(1, 1) = 4, \quad f_y(1, 1) = 7 \quad \text{であり, 接平面は}$$

$$z - 4 = 4(x - 1) + 7(y - 1) \quad \text{よって} \quad 4x + 7y - z - 7 = 0$$

7

底面の1辺を x , 高さを y とすると $V = x^2 y$ であり

$V_x = 2xy$, $V_y = x^2$ である。 $\Delta V \doteq V_x \Delta x + V_y \Delta y = 2xy \Delta x + x^2 \Delta y$ なので

$$\left| \frac{\Delta V}{V} \right| \doteq \left| \frac{2xy \Delta x}{x^2 y} \right| + \left| \frac{x^2 \Delta y}{x^2 y} \right| \leq 2 \times \left| \frac{\Delta x}{x} \right| + \left| \frac{\Delta y}{y} \right|$$


$$= 2 \times 0.01 + 0.01 = 0.03$$

よって誤差は3%以内。

演習 (p.108)

演習 1

(1)



(2)



(3)

